

Auengebiete von nationaler Bedeutung

2. Ergänzung des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 2003

Zones alluviales d'importance nationale

2ème complément à l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 2003

Zone golenali di importanza nazionale

2° complemento all'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale 2003

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

2. cumplettaziun da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 2003

Objekt

Objet

Oggetto

Object

311

Lokalität

Localité

Località

Localitad

Cerniat - La Valsainte

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Cerniat (FR)

Charmey (FR)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Le Javro

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

39 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

900 m

Objektyp

Type d'objet

Tipo d'oggetto

Tip d'object

Fliessgewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Source: Documentation complémentaire consultation 2. complément à l'inventaire des zones alluviales 2001

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

Cerniat - La Valsainte

Description de l'objet

Zone alluviale naturelle de l'étage montagnard des Préalpes. Cet objet est entouré de forêts naturelles, de plantations ainsi que de prairies et de pâturages.

Le Javro dans la région de Cerniat a un cours naturel et une forte dynamique. Il est caractérisé par la présence de chutes, torrents, rigoles d'érosion, îles, terrasses alluviales, glissements de terrain et bancs de graviers.

La largeur du vallon et les replats, accentués par deux grands seuils artificiels, ont permis le développement de forêts alluviales et de milieux pionniers assez étendus. La végétation est formée d'une communauté de hautes herbes nitrato-philés, de fourrés de saules d'altitude, de forêts d'aulne blanc, de forêts de frêne des substrats grossiers ainsi que de ripisylve de transition à saule drapé. Le gravier, les galets et les pierres dominent les sédiments nus. La diversité de la mosaïque végétale est élevée.

Cette zone alluviale abrite des animaux typiques dont le cincle et la bergeronnette des ruisseaux.

La naturité du cours d'eau et des milieux alluviaux confèrent à cet objet une valeur naturelle importante.

Délimitation de l'objet

Le périmètre englobe les forêts alluviales, les fourrés de saule d'altitude ainsi que les communautés herbacées. Il exclut les forêts de pente, les prairies et les pâturages. La transition de la forêt alluviale à la forêt de pente est progressive, ce qui a rendu la délimitation difficile dans certains tronçons.

Menaces et atteintes

Aucune menace grave ne pèse sur la zone, mis à part l'exploitation sylvicole. Les berges sont stabilisées de façon ponctuelle. Les chemins pédestres, les places de pique-nique et le tourisme sont présents par endroits.



Source: Documentation complémentaire consultation 2. complément à l'inventaire des zones alluviales 2001

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.