

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

66

Lokalität

Localité

Località

Localidad

Les Auges de Neirivue

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Albeuve (FR)

Grandvillard (FR)

Lessoc (FR)

Neirivue (FR)

Villars-sous-Mont (FR)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

La Sarine

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

78 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

750 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

Composition:

- | | |
|--|------|
| • Forêt alluviale à bois durs | 10 % |
| • Formations alluviales à bois tendres | 60 % |
| • Formations alluviales herbacées | 5 % |
| • Sans végétation | - % |
| • Surface d'eau | 20 % |
| • Autres zones non alluviales | 5 % |

Importance

Très intéressante et pittoresque zone alluviale d'aspect encore en grande partie naturel malgré la présence en amont d'un barrage de retenue. Le cours d'eau divisé en bras secondaires forme des îles et des bancs de gravier, colonisés par des gazons des lieux inondés à Agrostide à stolons, des groupements rudéraux de plantes vivaces, des groupements de lisières (à Pétasites hybride) et des saulaies alluviales de montagne où domine le Saule drapé. De grandes surfaces d'aunaie d'Aune blanc de montagne sont régulièrement inondées. On y trouve également encore des fragments de frênaie.

Menace

Plantations de résineux et de peupliers. Entraves à la dynamique des crues.

Observations

-

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.