

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

52

Lokalität

Localité

Località

Localitad

Les Iles de Villeneuve

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Villeneuve (VD)

Granges-près-Marnand (VD)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

La Broye

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

48 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

470 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

Composition:

- | | |
|--|------|
| • Forêt alluviale à bois durs | 50 % |
| • Formations alluviales à bois tendres | - % |
| • Formations alluviales herbacées | 25 % |
| • Sans végétation | - % |
| • Surface d'eau | - % |
| • Autres zones non alluviales | 25 % |

Importance

Unique vestige de forêt riveraine d'une telle étendue et encore inondée dans la Basse-Broye. Il y subsiste des fragments de frênaie à Orme, ainsi que des dépressions, qui sont les témoins d'anciens bras de la rivière, souvent occupées par des roselières et marais à grandes laiches. Les groupements de hautes herbes nitrophiles, ainsi que les groupements buissonnants basophiles (Berberidion) y sont abondamment représentés.

Menace

Extension des monocultures de peuplier. Mesures d'assainissement des zones humides.

Observations

Régénération des parties dégradées. Inondations plus fréquentes possibles par dérivation d'eau à partir de la Broye. Le castor (passage) y a été signalé.

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.