

Auengebiete von nationaler Bedeutung

2. Ergänzung des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 2003

Zones alluviales d'importance nationale

2ème complément à l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 2003

Zone golenali di importanza nazionale

2° complemento all'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale 2003

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

2. cumplettaziun da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 2003

Objekt

Objet

Oggetto

Object

**392**

Lokalität

Localité

Località

Localitad

**Cavril**

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Stampa (GR)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Orlegna

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

9.9 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

1550 m

Objektyp

Type d'objet

Tipo d'oggetto

Tip d'object

Fließgewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione del 2° complemento all'inventario delle zone golenali del 2001

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.

## Cavril

### Descrizione dell'oggetto

Zona golenale della fascia subalpina sul versante meridionale delle Alpi centrali (Val Bregaglia).

Il corso d'acqua impetuoso prende avvio dal Passo del Maloia e, per la pendenza ridotta, proprio in questa zona deposita parte dei suoi sedimenti. Il corso d'acqua presenta quindi una dinamica pronunciata ed è ramificato in più punti. La sequenza delle formazioni lungo il letto principale è la seguente:

- Vegetazione pioniera su alluvioni con sedimenti grossolani,
- Formazioni di salice e tamerici alpino sulle isole,
- Arbusteti comprensivi di diverse specie (*Alnus viridis*, *Salix elaeagnos*, *S. daphnoides*, *S. grandifolia*, *Larix decidua*, *Picea abies*) sulle porzioni più elevate.

Sui terrazzi lungo il corso d'acqua si sviluppano delle formazioni pioniere di tipo xerofilo. Un corso d'acqua lento costeggia la zona: sulle sue sponde si genera un terrazzo con ontano bianco e vegetazione erbacea molto densa. Vegetazione di tipo palustre si sviluppa presso le poche superfici umide dei terrazzi superiori.

### Delimitazione dell'oggetto

Il perimetro dell'oggetto si svolge su di una tratta di 900 m, comprensiva della vegetazione di tipo golenale del fondovalle, seguendo la strada in riva sinistra o il piede di pendio in sponda destra.

### Minacce e conflitti

L'intervento maggiore è costituito dalle arginature nella parte superiore dell'oggetto. In sponda destra (fuori dal perimetro) una superficie estesa è stata colmatata da una ripiena, ora protetta dai manufatti.

### Osservazioni

Lo stato attuale andrebbe preservato, in particolare per quanto attiene alla preziosa formazione di salici e tamerici alpino.

Ove possibile andrebbe rimosso il sistema di arginature allo scopo di offrire maggior spazio alla dinamica fluviale.



Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione del 2° complemento all'inventario delle zone golenali del 2001

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.