

Auengebiete von nationaler Bedeutung

2. Ergänzung des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 2001

Zones alluviales d'importance nationale

2ème complément à l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 2001

Zone golenali di importanza nazionale

2° complemento all'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale 2001

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

2. cumplettaziun da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 2001

Objekt

Objet

Oggetto

Object

**399**

Lokalität

Localité

Località

Localitad

**Clairbief**

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Saignelégier (JU)

Soubey (JU)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Doubs

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

12.81 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

480 m

Objektyp

Type d'objet

Tipo d'oggetto

Tip d'object

Fliessgewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Source: Informations issues du relevé de terrain dans le cadre du 2ème complément

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives.  
Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

## Clairbief

### Description de l'objet

Zone alluviale fluviatile de l'étage collinéen, caractéristique de la Vallée du Doubs, dans la chaîne jurassienne. La zone alluviale occupe toute la largeur de la zone plate du fond de la vallée.

La rivière présente un cours sinueux. La dynamique tranquille du Doubs (pente faible) provoque des variations de niveau d'eau, davantage que des érosions de berges. Le débit du Doubs est fortement influencé par l'usage hydro-électrique (éclusées). Le charriage naturel est moyen mais il est altéré par les installations présentes sur le cours du Doubs et sur ces différents affluents.

L'interface terre-eau étant abrupte et étroite (rives abruptes), de minces cordons de saules colonisent les berges du Doubs ; quelques stations de saulaies plus larges colonisent par endroit le lit mineur du Doubs.

La zonation caractéristique est constituée de :

- Végétation herbacée pionnière des sédiments, souvent dominée par le pétasite hybride.
- Fourrés de saule drapé ou de saule osier
- Forêt alluviale de frêne
- Cultures agricole et friches sur les anciennes terrasses alluviales.

La forêt d'aulne blanc est absente. Les forêts de pente des alentours sont escarpées et dominées par le hêtre.

En l'état actuel, la diversité de la mosaïque est relativement faible.

### Délimitation de l'objet

Le périmètre englobe l'ensemble de l'étroite zone plate du fond de la vallée. Le cadre paysager de l'objet est constitué de forêts de hêtre et de champs agricoles.

### Menaces et atteintes

La qualité de l'eau (eutrophisation) associée aux forts étiages constitue une menace pour l'objet.

### Remarques spéciales

L'objet a un potentiel de revitalisation. Les deux surfaces agricoles sises en rive gauche pourraient être transformées en prairie inondable et en fourrés de saules.

La salamandre tachetée est présente dans l'objet.

Source: Informations issues du relevé de terrain dans le cadre du 2ème complément

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.