

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

**167**

Lokalität

Localité

Località

Localitad

**Boschetti**

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Gudo (TI)

Sementina (TI)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Ticino

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

58 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

210 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione della 1a serie 1988, indagine sul campo tra il 1981 e il 1988.

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.

### **Composizione:**

- |                                  |      |
|----------------------------------|------|
| • Bosco golenale secco           | 95 % |
| • Bosco golenale umido           | - %  |
| • Golena priva di specie legnose | - %  |
| • Area priva di vegetazione      | - %  |
| • Superficie d'acqua             | 1 %  |
| • Area non golenale              | 4 %  |

### **Importanza**

Si tratta di uno dei pochi complessi golenali relativamente vasti nella Riviera e nel Piano di Magadino rimasti intatti dopo le correzioni del fiume e le bonifiche del secolo scorso. Ampie superfici vengono regolarmente allagate dalle abbondanti piene del Ticino e dalle acque dei torrenti laterali. Il bosco di golena a frassino e olmo ha carattere insubrico. Si incontrano un bosco submontano di golena ad ontano bianco con importanti colonie di *Equisetum hiemale*; frammenti di un saliceto a *Salix alba*, boscaglia golenale a *Salix amygdalina* e *Salix viminalis* con presenza di *Salix purpurea*; vegetazione ruderale persistente con *Impatiens glandulifera*, cespugli di crespino, vegetazione nitrofila dei bordi golenali, nonché canneti e cariceti.

### **Pericoli**

Estensione della coltura del pioppo.

### **Indicazioni**

Importante territorio di riserva di acqua freatica.

Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione della 1a serie 1988, indagine sul campo tra il 1981 e il 1988.

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.