

Auengebiete von nationaler Bedeutung

2. Ergänzung des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 2003

Zones alluviales d'importance nationale

2ème complément à l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 2003

Zone golenali di importanza nazionale

2° complemento all'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale 2003

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

2. cumplettaziun da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 2003

Objekt

Objet

Oggetto

Object

365

Lokalität

Localité

Località

Localitad

Ruscada

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Cresciano (TI)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Boggera

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

8.6 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

1120 m

Objektyp

Type d'objet

Tipo d'oggetto

Tip d'object

Fließgewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione del 2°complemento all'inventario delle zone golenali del 2001

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.

Ruscada

Descrizione dell'ampliamento

Zona golenale della fascia montana del Sud delle Alpi.

Golena selvaggia, relativamente ripida, costretta fra le formazioni montane che vi si compenetrano in continuazione, sia sul piano morfologico (detriti e conoidi), sia su quello vegetazionale (abete rosso nella foresta di ontano bianco).

La Boggera è un torrente vivace, con portate sostenute durante tutto l'anno, occasionalmente capace di rimaneggiamenti notevoli e trasporti di materiale – a giudicare dal calibro dei resti – cospicui.

Area completamente abbandonata dall'uomo da qualche decennio, forse già dopo gli anni quaranta: fra Sasso Bianco e Toscana si trova solo un vecchio muro, vestigia della condotta per una segheria azionata con sistema idraulico.

Le foreste di abete rosso, abete bianco (rari il faggio ed il pino silvestre) ospitano una decina di alberi che raggiungono notevoli dimensioni: alcuni crescono anche nella golena vera e propria, talora dominano del tutto gli ontani deperenti, formano un sottobosco buio, dominato da Oxalis e tappeti di muschio e potrebbero – sulla base di criteri morfologici e idraulici – essere definiti come golena a legno duro atipica, periodicamente sommersa e rinnovata da depositi meno grossolani.

A valle dell'oggetto la morfologia del torrente cambia radicalmente: la Boggera incide una profonda gola creando un contesto climatico e fonico particolari del tutto smorzati un centinaio di metri dopo, dove la captazione con dotazione residuale nulla non lascia scampo alcuno alla vita acquatica che a monte si sviluppa indisturbata.

Delimitazione dell'ampliamento

Può essere ritenuta di importanza nazionale grazie alle disposizioni speciali definite per le zone incassate che prevedono una superficie minima di oltre 2 ha indipendentemente dalla larghezza.



Il perimetro costeggia il piede del pendio sulla riva destra e segue il sentiero sulla riva sinistra.

Minacce e conflitti

Eventuali interventi forestali non indispensabili.

Osservazioni

Nell'ambito della restituzione di un deflusso minimo è opportuno tenere in debito conto anche il valore biologico posto a monte (drift biologico).



Fonte: Documentazione supplementare alla consultazione del 2°complemento all'inventario delle zone golenali del 2001

Avvertenza: i dati si basano sulla valutazione degli esperti al momento dell'indagine e non sono esaustivi. Le cifre e i nomi dei comuni riflettono lo stato dell'epoca.