

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

118

Lokalität

Localité

Località

Localitad

Grand Bataillard

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Chavannes-de-Bogis (VD)

Commugny (VD)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

La Versoix

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

55 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

460 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

Composition:

- | | |
|--|------|
| • Forêt alluviale à bois durs | 45 % |
| • Formations alluviales à bois tendres | 25 % |
| • Formations alluviales herbacées | 15 % |
| • Sans végétation | - % |
| • Surface d'eau | 5 % |
| • Autres zones non alluviales | 10 % |

Importance

Vaste complexe de formations alluviales et marécageuses, unique en son genre sur tout le Plateau suisse, remarquable par son cours d'eau naturel à courant lent et abondants méandres, ainsi que par la diversité de ses communautés végétales dont on distingue principalement: roselières et marais à grandes laiches, bas-marais alcalins, groupements d'hélophytes des eaux courantes, groupements ripicoles de hautes herbes nitrophiles, moliniaies, groupements de hautes herbes hygrophiles et prairies humides, groupements buissonnants basophiles, fragments d'aunaie d'Aune blanc submontagnarde, saulaies alluviales de plaine, frênaie à Merisier à grappes ainsi que des boisés apparentés à la frênaie à Orme.

Menace

Monocultures de peupliers et de résineux. Drainage. Aménagements correctifs du lit de la rivière. Pollutions diverses (mazout, produits agricoles).

Observations

Importante population bien établie de castors.

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.