

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

**211**

Lokalität

Localité

Località

Localidad

**Les Monod**

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Apples (VD)

Ballens (VD)

Mollens (VD)

Montricher (VD)

Pampigny (VD)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Le Veyron

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

67 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

670 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Bach

Ruisseau

Ruscello

Aual

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

### Composition:

- |  |      |
|--|------|
| • Forêt alluviale à bois durs          | 3 %  |
| • Formations alluviales à bois tendres | 20 % |
| • Formations alluviales herbacées      | 35 % |
| • Sans végétation                      | - %  |
| • Surface d'eau                        | 2 %  |
| • Autres zones non alluviales          | 40 % |

### Importance

Exceptionnel complexe alluvial et marécageux, comprenant la plus vaste aunaie marécageuse de Suisse, située dans une dépression régulièrement immergée par les crues du Veyron. Ce ruisseau, naturel sur l'ensemble de son cours, divague librement en de multiples méandres sur le marais de la Mura en bonne partie planté de peupliers.

Outre l'aunaie marécageuse, on y distingue la frênaie à Merisier à grappes, des marais à grandes laiches, des groupements de hautes herbes nitrophiles, des groupements de hautes herbes hygrophiles, des moliniaies ainsi que des parcelles de prairies et pâturages amendés.

### Menace

Populiculture. Drainage.

### Observations

Retour aux conditions naturelles en renonçant graduellement aux plantations de peuplier.

Le débit de la Venoge est dans une forte mesure déterminée par son affluent Le Veyron. Par conséquent, la région marécageuse Grand Marais-Le Monod (Les Monneaux) est d'une importance capitale pour la régime hydrologique de la Venoge et pour ses zones alluviales.

Les objets inventoriés dans le système La Venoge-Le Veyron, doivent être considérés comme dépendant étroitement les uns des autres.

Voir aussi objets 120 à 122.

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.