

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

**201**

Lokalität

Localité

Località

Localidad

**Les Grèves d'Yverdon – Les Tuileries**

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i) e (VD)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Grandson (VD)

Yverdon (VD)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

Lac de Neuchâtel

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

35 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

430 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Seeufer

Rive lacustre

Litorale lacustre

Riva da lai

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

### Composition:

- |  |      |
|--|------|
| • Forêt alluviale à bois durs          | 80 % |
| • Formations alluviales à bois tendres | 10 % |
| • Formations alluviales herbacées      | 10 % |
| • Sans végétation                      | - %  |
| • Surface d'eau                        | - %  |
| • Autres zones non alluviales          | - %  |

### Importance

Cet objet fait partie de l'une des dernières grèves lacustres de Suisse encore occupée par de grandes surfaces boisées possédant les mêmes caractéristiques que les forêts alluviales des grandes rivières. On y distingue les groupements suivants: roselières, marais à grandes laiches, groupements de hautes herbes hygrophiles, saulaies alluviales de plaine (avant tout formations buissonnantes) groupements buissonnants basophiles, aunaies d'Aune blanc submontagnardes, frênaies à Orme.

### Menace

Extension des zones d'urbanisation. Aménagement des grèves. Eutrophisation des eaux. Populiculture intensive et monocultures de résineux.

### Observations

Refuge d'oiseaux nicheurs et migrateurs d'importance nationale.

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.