

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

121

Lokalität

Localité

Località

Localidad

La Roujarde

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Gollion (VD)

Penthaz (VD)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

La Venoge

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

16 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

420 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Fluss

Rivière

Fiume

Flum

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

Composition:

- | | |
|--|------|
| • Forêt alluviale à bois durs | 80 % |
| • Formations alluviales à bois tendres | - % |
| • Formations alluviales herbacées | 10 % |
| • Sans végétation | - % |
| • Surface d'eau | 10 % |
| • Autres zones non alluviales | - % |

Importance

Zone alluviale bien préservée, inondée et active de l'un des derniers cours d'eau en majeure partie intact et naturel du Plateau suisse. Les fréquentes crues souvent violentes, sapent les bords des terrasses et les rives concaves des méandres, et remanient les plages graveleuses. Compte également d'intéressants bras secondaires temporairement actifs, avec des flaques d'eau stagnante peuplées de groupements à Lentille d'eau. La végétation consiste en gazons des lieux inondés à Agrostide à stolons, groupements ripicoles de hautes herbes nitrophiles et groupements rudéraux de plantes vivaces. La forêt alluviale est composée de frênaie à Orme accompagnée de fragments de frênaie à Merisier à grappes, d'éléments des chênaies-charmaies, ainsi que des groupements buissonnants basophiles.

Menace

Monocultures de peupliers et de reS1neux. Aménagements correctifs des rives. Pollutions industrielles et agricoles, station d'épuration des eaux, usine d'élimination des ordures et boues d'épuration.

Observations

Les objets inventoriés dans le système La Venoge-Le Veyron, doivent être considérés comme dépendant étroitement les uns des autres.

Voir aussi objets no 120, 122 et 211.

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.