

Auengebiete von nationaler Bedeutung

1. Serie des Bundesinventars der Auengebiete von nationaler Bedeutung 1992

Zones alluviales d'importance nationale

1ère série de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale 1992

Zone golenali di importanza nazionale

1a serie dell'inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale 1992

Zonas alluvialas d'impurtanza naziunala

1. seria da l'inventari federal da las zonas alluvialas d'impurtanza naziunala 1992

Objekt

Objet

Oggetto

Object

**132**

Lokalität

Localité

Località

Localidad

**Derborence**

Gemeinde(n) / Kanton(e)

Commune(s) / Canton(s)

Comune(i) / Cantone(i)

Vischnanca(s) / Chantun(s)

Conthey (VS)

Gewässer

Cours d'eau

Corso d'acqua

Currents

La Lizerne

Lac de Derborence

Fläche

Superficie

Superficie

Surfatscha

33 ha

Höhenlage

Altitude

Altitudine

Autezza

1470 m

Gewässertyp

Type de cours d'eau

Tipo di corpo idrico

Tip d'auas

Wildbach, Seeufer

Torrent, Rive lacustre

Torrente, Litorale lacustre

Torrent, Riva da lai

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.

### Composition:

- Forêt alluviale à bois durs - %
- Formations alluviales à bois tendres 20 %
- Formations alluviales herbacées 45 %
- Sans végétation 10 %
- Surface d'eau 15 %
- Autres zones non alluviales 10 %

### Importance

Vaste zone d'alluvionnement de torrents et d'éboulement dans un remarquable paysage sauvage et austère. Sur le delta de la Derbonne, brousse dense de Saules drapés mêlée de Saules noircissants et de Saules à grandes feuilles.

Au bas du cône de déjection de la Chevilleince et des torrents temporaires voisins, en bordure du lac, terrains marécageux à petites laiches fréquemment inondés, puis prairies et pâturages discontinus parsemés de buissons de saules (Saule drapé, Saule noircissant, Saule à grandes feuilles) copieusement irrigués à chaque crue; sur les parties les plus élevées, groupements alpigènes des alluvions caillouteuses bien développés (peuplement étendus d'Epilobe de Fleischer, tapis de Pétasite paradoxal, abondantes touffes de Linaire des Alpes ainsi que de Saxifrage Faux Aizoon).

### Menace

Parcours du bétail.

### Observations

-

Source: Documentation complémentaire consultation 1ère série 1988, enquête de terrain entre 1981 et 1988.

Avertissement: Les données reposent sur l'évaluation des experts au moment de l'enquête et ne sont pas exhaustives. Les chiffres et les noms des communes reflètent la situation de l'époque.